




# Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau  
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 32

Freitag, 14.06.2024

**Entwicklungsstadium/Witterung:** Der Apfel ist im Stadium BBCH 72-74. Für heute und morgen sind Schauer gemeldet. Danach wird eine Schönwetterperiode prognostiziert.

## Kernobst

**Schorf/Mehltau:** Weiterhin gilt: In Anlagen mit Schorfbefall sind Applikationen in engeren Abständen fortzuführen, in schorffreien Anlagen sind Belagserneuerungen im ca. 10 – 14-tägigem Abstand oder nach ca. 30 – 35 mm Niederschlag durchzuführen. Nutzen Sie ein Dithianon- oder Captan-haltiges Produkt unter Zusatz von z. B. Topas (0,125 l/ha/m; max. 3x/Saison; aus Rückstandsgründen bis max. 30 Tage vor der Ernte). Mehлтаubehandlungen bis zum Triebabschluss im Abstand von ca. 14 Tagen fortführen.

**Beachten Sie die erhöhte Wartezeit von Delan WG auf 42 Tage!**

**Feuerbrand:** Im Gebiet sowie in ganz Baden-Württemberg steigen die Zahlen der Feuerbrandmeldungen. Für eine bessere Übersicht über die Befalls Situation, kontrollieren Sie Ihre Anlagen. Ggf. kontaktieren Sie die Beratung.

**Apfelwickler:** Nach Prognose haben wir den Flughöhepunkt erreicht. Aufgrund der schlechten Witterung sind die Falterfänge eher verhalten. Trotzdem findet man bereits die ersten Einbohrungen. Bei Betrieben, die aufgrund des Vorjahresbefall zwei Coragen-Behandlungen eingeplant haben, liegt die erste Behandlung etwa drei Wochen zurück. Die Zweite Behandlung sollte spätestens in der Folgewoche erfolgen. Weiterhin sollte die Wirkung von Coragen in den schon behandelten Anlagen durch Granulose-Virusapplikationen unterstützt werden. Daher bei anstehenden Pflanzenschutzmaßnahmen ebenfalls ein Granulosevirus-Präparat (ca. 3/10 Vollaufwand) beimischen. Wenn warme Abendtemperaturen prognostiziert sind („Biergartenwetter“) den Granuloseviren-Aufwand erhöhen.

**Fruchtschalenwickler:** Bei regulären IP-Betrieben wird der Fruchtschalenwickler mit den Maßnahmen gegen den Apfelwickler mitreguliert. In Problemanlagen überschneidet sich die nötige Coragen-Behandlung mit der oben genannten Behandlung gegen den Apfelwickler.

## **Grüne Apfelblattlaus**

In einigen Obstanlagen zeigt sich Befall an den Triebspitzen. Gleichzeitig ist ein guter Nützlingsbesatz vorhanden. Kontrollieren und Beobachten Sie Ihre Anlagen. In Junganlagen kann es ggf. zu wirtschaftlichen Schäden kommen, dort kann z.B. Teppeki eingesetzt werden.

## Steinobst

### Zwetschge

**Pflaumenwickler:** Planen Sie die Behandlungen in Abhängigkeit der Erntetermine wie im Info-Schreiben Nr. 5 vom Dienstag, 28.05.2024 beschrieben für die Reifegruppen Katinka und Cacak's Schöne ein. Die Larvizid-Behandlungen für die Spätsorten (Reifegruppe Presenta) können für August eingeplant werden.

## Kirschen

**KFF/KEF:** Derzeit sind die Fangzahlen und Eiablagen gering. Kontrollieren Sie Ihre eigenen Fallen und Früchte. Weitere Informationen zur Behandlungsstrategie siehe Info-Schreiben Nr. 6 vom Samstag, 01.06.24.

Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis am KOB

Herr Haltmaier: 0751-7903-305 oder 0176 727 68 775; Herr Dr. Scheer 0751 7903-306 oder 0176 205 411 73

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.