


# Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau  
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



**Obstbau**

Nr. 26

Dienstag, 30.04.2024

**Entwicklungsstadium/Witterung:** Der Apfel ist, bis auf späte Sorten/ Lagen, überwiegend im Stadium Blühende (BBCH 69). In vielen Anlagen blüht es dennoch am einjährigen Holz. Neupflanzungen stehen ebenfalls noch in Blüte. Ab Donnerstag sind Niederschläge möglich, deren Intensität und Länge je nach Modell unterschiedlich ausfallen. Die Prognosemodelle sind wieder sehr uneinheitlich! Behalten sie daher Ihre lokale Wettervorhersage im Blick.

## Kernobst

**Schorf/Kelch- und Kernhausfäule/Mehltau:** Der Blattzuwachs seit den letzten Fungizidbehandlungen war, bedingt durch die vorhandene Feuchte und Wärme, enorm. Der Schorfpilz ist nach dem Prognosemodell (Welte) jetzt bei etwa 10 % der maximalen Ascosporennachreife und damit nachlassend. In unbehandelten Flächen finden sich an den älteren bis ältesten Rosettenblättern erste Schorfflecken. Die Situation in Ihren Beständen ist noch ungewiss. Bei anstehenden Maßnahmen daher zur Sicherheit ein Belagsfungizid (Captan- / Dithianon-haltig) zumischen. Sofern noch keine Mehltau-Behandlung erfolgt ist, kann eine Anwendung mit Flint durchgeführt werden, das gleichzeitig auch gegen Kelch- und Kernhausfäulen wirkt. Beim Einsatz eines Captan-haltigen Produktes können phytotoxische Schäden in Kombination mit Ausdünnmitteln folgen. Halten Sie ggf. die nötigen Abstände zwischen den Behandlungen ein.

**Feuerbrand:** Mit der Erwärmung steigt das Risiko für mögliche Infektionen in noch blühenden Beständen (z. B. Neupflanzungen, Junganlagen) wieder an. Mit aktueller Prognose (heute bis 25 °C, morgen 8 °C /25 °C) wird morgen eine Temperatursumme um 120 (CDH18) erreicht. Insbesondere in Beständen, in denen selbst oder im direkten Umfeld in den letzten Jahren Feuerbrand aufgetreten ist, kann eine heutige Behandlung mit BlossomProtect mögliche Risiken abdecken.

**Birnblattsauger:** Beobachtungen zeigen, dass in Birnenanlagen ein Anstieg der Adulten über das Wochenende erfolgte. Es ist mit weiteren Eiablagen zu rechnen. Damit schiebt sich der Zeitpunkt der Moventoanwendung (Haupteiablage: überwiegend dottergelbe Eier und allererste Junglarven) noch weiter. Eigenständig Lupenkontrollen durchführen.

**Blutlaus:** Bei geplanter Movento-Anwendung die Bienengefährlichkeit des Produktes beachten! Bestände vor dem Ausbringen unbedingt **mulchen und auf Nachblüher kontrollieren!**

## Steinobst

Siehe Warndient Nr. 25 vom 25.04.2024

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis am KOB

Herr Haltmaier: 0751-7903-305 oder 0176 727 68 775; Herr Dr. Scheer 0751 7903-306 oder 0176 205 411 73

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.